

**Blackwellisches Kräuterbuch von Elisabeth Blackwell, 1757**





*Spica latifolia.*

{ 1-6. Blüthe  
7. s. Saame }

Garten-Spick.



*Stoechas arabica*  
*vel purpurea.*

1-18. Blume  
 19. Frucht  
 20. Saame

Arabischer Stoechas.

TAB. 294. Lat. Lauendula, Germ. Lavendel, Graec. *Ψευδογάδος*, Angl. Lauender, Ital. Lauanda, Gall.   
 © Lauande, Belg. Lauendul, Lauender.

1. Duo circiter pedes altitudine aequat, folia dilute virent, flores sunt coerulei.

2. In meridionalibus Galliae et Hispaniae provinciis crescit, in Anglia vero in hortis colitur, iulioque florēt.

3. Laudatur tamquam cephalicum, cardiacum atque neruinum in omnibus neruorum morbis. Pellit flatum ex ventriculo et intestinis, et colicam compescit. Externe adhibetur in calidis et roborantibus epithematibus.

1. Er steigt ohngefähr zwey Fuß hoch, die Blätter sind licht grün, die Blumen blau.

2. Er wächst in den Mittägigen Theilen von Frankreich und Spanien wild, in Engelland aber in Gärten, da er im Julius blühet.

3. Er wird für Haupt- und Herzstärkend gehalten, und bey allerley Krankheiten der Nerven gebraucht. Er treibt auch die Winde aus dem Magen und den Gedärmen, und bewahret vor dem Leibreissen. Neuseflich bedient man sich desselben zu erwärmend- und stärkenden Ueberschlägen.

4. NOM. GEN. Lauendula Rai. meth. 59. Hist. I. 512. Knauth. meth. 96. Riv. p. 11. Heuch. Jnd. 25. Kram. 51. Hall. Goett. 342. Lauandula Tourn. 198. Rupp. 234. Herm. Lugd. Bat. 358. Boerb. I. 152. Linn. Gen. n. 564. Edit. V. 630. Roy. 322. Ludvv. n. 220. Wach. 140. Morand. El. 12. Bergen. Fl. Francf. 103.

5. NOM. SPECIF. Nardus italica Matth. 31. Pseudo-nardus, quae Lauandula vulgo J. Baub. III. 281. Pseudo-nardus femina f. Lauendula Cam. Epit. 18. Spica lauendula Lob. Jc. I. 431. Hist. 236. Spica alba Tabern. 754. Lauendula Ruell. 288. Lonic. 154. a. Lauendula femina Lugd. 919. Lauandula flore coeruleo Boerb. I. 152. Lauandula angustifolia C. B. pin. 216. Herm. Lugd. Bat. 358. Tourn. 198. Rupp. 235. Kram. 51. Bergen. Fl. Francf. 103. Hall. Goett. 342. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis Linn. H. Cliff. 303. Mat. med. 296. Spec. 572. n. 1. Roy. 322. Wach. 140. Lauendula altera Dod. 273. Lauendula minor Cord. Hist. 105. a. Lauendula minor seu spica Rai. Hist. I. 513. Park. 73. Gerard. 584. Morif. H. Ox. III. 352. S. XI. t. 1. f. 3. Lauendula Riv. Monop. t. 54. fig. 2. angustifolia p. 11. Morand. Hist. 43. t. 27. f. 2. Weinm. 233. t. 622. fig. b. Lauendula flore coeruleo officinarum Heuch. Jnd. 25.

Nota. BLACKWELLIANAE icones sunt ipsa planta et fig. 2. 4. 8. reliquas, floris partes sistentes, secundum naturam addidimus. Caulibus ramosis folia angusta, opposita adhaerent, quibus in summitate flores, in spicam dispositi innascuntur. Flos monopetalus irregularis fig. 1. in calyce monophyllo, tubuloso a, continetur, ex quo corollae limbus eminent in duo labia diuisus, superius incisum b, inferius tripartitum ccc. existit. Inferior corollae pars tubulosa est, vt extracta ex calyce eadem demonstrat fig. 2, in qua dissecta fig. 3. non tantum lacinae limbi b. ccc. sed etiam quatuor minora stamina intus contenta d. apparent. In calyce fig. 4, remota corolla, stylus superest fig. 5. 6. e. qui ad fundum eius dimissus fig. 7. f. Cent. III. cum

Ann. Die Abbildung der Pflanze nebst fig. 2. 4. 8. ist von der BLACKWELL, die andern insgesammt sind von uns nach der Natur gezeichnet worden, und drücken die Theile der Blume aus. An den ästigen Stengeln stehen schmale Blätter einander gegen über, an den obern Ende derselben aber die Blumen in einer Aehre. Die einblättrichte Blume ist ungleich fig. 1, und stehet in einem einblättrichten, röhrenförmigen Kelche a, über welchen die in zwey Lefzen getheilte Blumendecke vorraget; die obere von diesen Lefzen ist eingeschnitten b, die untere aber dreymahl getheilt ccc. Der untere Theil der Blume ist eine Röhre, welche, aus dem Kelche herausgezogen, in fig. 2. zum Vorschein kommt. In der zerschnittenen fig. 3. siehet man nicht nur die Einschnitte

cum quatuor seminibus g. cohaeret, quae inter se composita quadratam, separata oblongam figuram fig. 8. habent.

fig. 5. 6, welcher bis auf den Grund desselben hineinsteiget fig. 7. f, und mit vier Saamen g. zusammen hängen. Die Saamen haben, wenn sie noch beyammen stehen, eine vierechte, ieder besonders aber eine länglichte Gestalt fig. 8.

Einschnitte des breiten Randes b. ccc, sondern auch vier kleine Staubfäden innwendig anhängen d. Wenn man die Blumendecke weggenommen, so ist in dem Kelche der Griffel allein übrig

TAB. 295. *Lat.* Spica. *Germ.* Spick, Spicanard. *Angl.* Lauender - Spike, *French* Spicknarde. *Ital.* Spigo. *Gall.* Aspice. *Belg.* Spykenærde, gemeyne Spyke.

1. Ad quatuor vsque pedes adfurgit, folia dilute virent, flores coerulei sunt.

2. In calidis terris sponte provenit, in Anglia vero in hortis colitur et floret mense julio.

3. Iisdem, ac prior, pollet virtutibus, raro tamen in officinis adhibetur, dum illa copiose adhuc haberi potest.

4. NOM. GEN. vid. Tab. praeced. et adde: Spica *Heuch. Jnd.* 26.

5. NOM. SPECIF. Spica *Trag.* 58. *Ruell.* 288. Spica recentiorum (Nardus Italica *Lob. Hist.* 235. Spica flore coeruleo officinarum *Heuch. Jnd.* 26. Pseudo-nardus, quae vulgo Spica *J. Bauh. III.* 280. Pseudo-nardus seu Nardus italica *Cam. Epit.* 17. Nardus germanica, Spica nardi *Lonic.* 154. a. Nardus Italica siue recentiorum *Fuchsi et Matthioli Pseudo-nardus Lob. Jc. I.* 431. Lauendula *Dorst.* 164. a. *Dod.* 273. *Matth.* 32. Lauendula latifolia *C. B. pin.* 216. *Tourn.* 198. *Riv. monop. t.* 54. f. 1. *Kram.* 51. *Weim.* 233. t. 622. f. a. *Hall. Goett.* 342. Lauendula maior seu vulgaris *Rai. Hist. I.* 312. *Park.* 73. *Morif. H. Oxon. III.* 352. *S. XI. t. 1. f. 1. et 2.* Lauendula flore coeruleo *H. Eyst. Aest. O.* 14. F. 6. f. 3. Lauandula I. *Tabern.* 755. *Gesn. Hort.* 264. a. Lauandula mas *Lugd.* 920. Lauandula maior *Cord. Hist.* 104. b. Lauandula latifolia *Herm. Lugd. Bat.* 358. *Boerb. I.* 152. *Rupp.* 234. *Bergen. Fl. Francf.* 103. *Morand. Hist.* 43. t. 27. f. 1. Lauandula flore coeruleo *Gerard.* 583. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis *Linn. H. Vps.* 162. *Mat. med.* 296. *Spec.* 572. n. 1.

*Nota.* Eadem, quae de antecedenti planta diximus, ad hanc simul referri debent, leuissima intercedit differentia, in latiori foliorum expansione conspicua, quae ita quidem variat, ut in vno loco et solo cultae plantae, pro ratione incrementi celerioris aut retardati utramque varietatem exhibeant. Hinc plerique recentiorum botanicorum utramque coniungunt, iure quidem. *Blackwellianis delineationibus addidimus fig. 1. 3. 5. 6. 7.*

1. Er steigt bey vier Fuß hoch, die Blätter sind hellgrün, die Blumen blau.

2. Er wächst wild in warmen Ländern, wird aber in Engelland in Gärten gezogen, und blüht im Julius.

3. Er hat mit dem vorher beschriebenen gleiche Kräfte, allein man bedient sich dessen sehr selten in den Apotheken, da man den andern haben kan.

4. NOM. GEN. vid. Tab. praeced. et adde: Spica *Heuch. Jnd.* 26.

5. NOM. SPECIF. Spica *Trag.* 58. *Ruell.* 288. Spica recentiorum (Nardus Italica *Lob. Hist.* 235. Spica flore coeruleo officinarum *Heuch. Jnd.* 26. Pseudo-nardus, quae vulgo Spica *J. Bauh. III.* 280. Pseudo-nardus seu Nardus italica *Cam. Epit.* 17. Nardus germanica, Spica nardi *Lonic.* 154. a. Nardus Italica siue recentiorum *Fuchsi et Matthioli Pseudo-nardus Lob. Jc. I.* 431. Lauendula *Dorst.* 164. a. *Dod.* 273. *Matth.* 32. Lauendula latifolia *C. B. pin.* 216. *Tourn.* 198. *Riv. monop. t.* 54. f. 1. *Kram.* 51. *Weim.* 233. t. 622. f. a. *Hall. Goett.* 342. Lauendula maior seu vulgaris *Rai. Hist. I.* 312. *Park.* 73. *Morif. H. Oxon. III.* 352. *S. XI. t. 1. f. 1. et 2.* Lauendula flore coeruleo *H. Eyst. Aest. O.* 14. F. 6. f. 3. Lauandula I. *Tabern.* 755. *Gesn. Hort.* 264. a. Lauandula mas *Lugd.* 920. Lauandula maior *Cord. Hist.* 104. b. Lauandula latifolia *Herm. Lugd. Bat.* 358. *Boerb. I.* 152. *Rupp.* 234. *Bergen. Fl. Francf.* 103. *Morand. Hist.* 43. t. 27. f. 1. Lauandula flore coeruleo *Gerard.* 583. Lauandula foliis lanceolatis integris, spicis nudis *Linn. H. Vps.* 162. *Mat. med.* 296. *Spec.* 572. n. 1.

*Ann.* Was wir von der vorhergehenden Pflanze angeführet haben, läßt sich auch von unsrer sagen: Nur ein geringer Unterschied zeigt sich in der Breite der Blätter, welche aber auch sehr veränderlich ist, also, daß bitters Pflanzen in einer Gegend und Boden, nach der Beschaffenheit ihres schnellern oder langsamern Wachstumes, beide, sowohl schmale, als breite Blätter tragen. Deshalb verbinden auch die neuern Krenterkenner beide Pflanzen mit guten rechte, unter eine Gattung. Wir haben zu den *Blackwellischen* Abbildungen noch fig. 1. 3. 5. 6. 7. hinzugefüget.

TAB. 241 *Lat.* Stoechas arabica vel purpurea. *Germ.* Stoechaskraut, Römischer Welscher Kümmel oder Thymian. *Graec.* Στίχας, Στίχας. *Angl.* Sticadove, Stechas, French Lavender. *Hisp.* Tomani, Canuello. *Ital.* Stechade, *Gall.* Du Stechas. *Belg.* Arabische Stoechas, of Stichas.

1. Haec planta fruticulus fit, et ad trium pedum altitudinem adsurgit, folia ex viridi albicant, flores profunde purpureo colore insigniuntur.

2. Sponte in Hispania crescit, nec non in meridionalibus Galliae regionibus. In Anglia in hortis colitur et aprilii maioque mense floret.

3. Floribus cardiaca et cephalica virtus adscribitur. confortant nervos, et cum usu proficuo in apoplexia, paralyti neruorum distentionibus adhibentur. Aperiunt atque attenuant, obstant veneno, et catamenia feminarum promouent.

4. *NOM. GEN.* Stoechas *Rai. Meth.* 59. *Hist. l.* 513. *Magn. Car.* 93. *Tourn.* 201. *Rupp.* 235. *Heuch. Ind.* 26. *Knautb. meth.* 95. *Boerb. l.* 153. *Mor. El.* 12. *Lauandula Linn. Gen. n.* 564. *edit. P. n.* 630. *Roy.* 322. *Ludov. n.* 220. *Wach.* 140. *Lauandula. Hall. Gott.* 342.

5. *NOM. SPEC.* Spica italica *Caes.* 459. *Stichas Cord. Hist.* 105. *Stoechas Trag.* 212. *Lonic.* 153. *b. Dod.* 275. *Lob. Hist.* 234. *Jc. l.* 429. *Matth.* 518. *Camer. Epit.* 465. *Gesn. H.* 283. *a. Lugd.* 918. *Stoechas arabica Ruell.* 500. *Tab.* 759. *Stoechas arabica, vulgo dicta J. B. III.* 277. *Rai. Hist. l.* 514. *Magn. Car.* 93. *Weimm.* 379. *t.* 950. *Jfg.* 4. *Stoechas breuioribus ligulis Clus. Hist. l.* 344. *Morif. H. Ox. III.* 353. *S. XI. t.* 1. *f. 1.* *Stoechas purpurea C. B. pin.* 216. *Tourn.* 201. *Herm. H. Lugd. Bat.* 583. *Boerb. l.* 153. *Rupp.* 235. *Morand. H.* 43. *t.* 27. *f.* 3. *Stoechas seu spica hortulana Ger.* 585. *Stoechas vulgaris Park.* 67. *Lauandula foliis lanceolato-linearibus, spica comosa Linn. H. Cliff.* 303. *H. Vpf.* 162. *Mat. med.* 297. *Spec.* 573. *Roy.* 323. *Wach.* 140. *Hall. Gott.* 342.

*Nota.* Blackwellianae icones sunt *Fig. l.* 1. 4. 5. 10. 12. 17. 19. 20. reliquas addidimus. Minoris staturee planta est atque ramosa, foliis angustis, integerrimis, oppositis, obtuse acuminatis. In summitate caulium atque ramorum flores in spicam congesti haerent, quorum octo diversi sunt ordines, ex quibus vero quatuor tantum vna vice florent; his floribus inter sunt non solum tenuia foliola, villosa, coloris violacei, pluribus venis picta, quae botanicis bractae dicuntur, sed etiam alia ex superiori spicae parte haerent, eamque ornant *fig. 1. 2.* nec non similia ad fundum spicae adhaerent *fig. 3. 4.* Series florum vna si efflorescit *fig. 5. 6.* inferiores primo, post etiam superiores expandit corollas. Horum florum singulus tres partes habet *fig. 7.* bracteam scilicet inferius cum obuoluentem a, calycem b, et corollam c. Bractea cordato-acuminata est *fig. 8.* calyx vero monophyllus, in duo labia secedit: superius ex vnica constat lacinia reliquis maiori *fig. 7. 11. 16. 18.* g. et cordata, lata: inferius labium in quatuor dirimitur, breues et acutas. Inferior eius tubus cylindricus est et inferiorem corollae partem tegit *fig. 10. 11.* superior enim limbus corollae tantum ex eo eminet c. Corolla ex calyce exserta *fig. 13.* a latere visa *fig. 12.* ex angusto cylindro in limbum superius expanditur obliquum, in duo labia etiam diuisum, quorum superius bifidum *fig. 10. 12.* lacinia maiori, inferius trifidum, minoribus lacinia est. Laciniae ipsae subrotundam figuram habent magnitudine sibi aequales. Latius si incrementum accesserit, aliquando superius corollae labium tripartitum existit *fig. 7. g.* Stamina quatuor cum antheris suis intra corollam latent, breuia sunt, ita tamen, vt ex his duo breuiora, duo paullo longiora deprehendantur *fig. 14. d.* His interest stylus vnicus *fig. 15. 16. e.* tenuis, sigmate obtusitate terminatus, inferius

1. Dieses Staudengewächse steigt ohngefähr drey Fuß hoch, die Blätter sind weislich grün, die Blumen dunkel purpurfarbig.

2. Es wächst wild in Spanien und den Mittägigen Theilen Frankreichs, in Engelland aber in Gärten, und blüht im April und May.

3. Die Blumen hält man für Herz- und Hauptstärkend, sie bekräftigen die Nerven, und werden mit Nutzen bey Schlagflüssen, Lähmungen, und Zuckungen der Nerven gebraucht. Sie sind auch eröffnend und verdünnend, widerstehen dem Gifte, und befördern die Monatliche Reinigung der Frauen.

*Anm.* *Fig. l.* 1. 4. 5. 10. 12. 17. 19. 20. sind Blackwellsche Zeichnungen; die übrigen haben wir hinzugetzt. Die Pflanze wächst niedrig, und schlägt in Nests aus, welche mit schmalen, ganzen, stumpfsägezähnten und einander gegen über stehenden Blättern versehen sind. An dem Gipfel der Stengel und Zweige stehen die Blumen an einer Aehte beisammen, und zwar in acht besondern Reihen, wovon aber nur viere zu gleicher Zeit aufblühen. Zwischen diesen Blumen stehen nicht allein dünne, rauche, blaue und mit vielen Adern gezeirte Blättgen, welche die Pflanzenforscher bracteas heißen, sondern es sind auch noch andere an dem obern Theile der Aehte befindlich, und dienen derselbe zur Zerthe *fig. 1. 2.* ja eben dergleichen hängen unten an dem Ende der Aehte *fig. 3. 4.* Wenn eine Reihe von diesen Blumen sich aufschliesset, so breiten sich *fig. 5. 6.* die untern zuerst, hernach auch die obern Blumendecken aus. Jede Blume hat drey Theile *fig. 7.* nämlich unten das bunte Blättgen, welches dieselbe unten umhüllet a, den Kelch b, und die Blumendecke c. Das bunte Blättgen ist herzförmig und vornen zugespitzt *fig. 8.* Der Kelch besteht aus einem Blättgen, und theilet sich in zwey Lefzen: die obere bestehet aus einem einzigen Blättgen, welches etwas grösser als die übrige *fig. 7. 11. 16. 18. g.* herzförmig und breit ist; die untere Lefze theilet sich in vier kurze und spizige Einschnitte. Der untere Theil des Kelches ist eine walzenförmige Röhre und bedeckt den untern Theil der Blume *fig. 10. 11.* der obere breite Rand der Blumendecke raget nur allein hervor c. Diese stellet ausser ihrem Kelche *fig. 13.* von der Seite *fig. 12.* dar: Sie breitet sich aus einer engen Röhre in einen breiten, schief stehenden Rand, welcher gleichfalls in zwey Lefzen getheilet ist. Die obere Lefze hat zwey große Einschnitte *fig. 10. 12.* die untere aber hat deren drey, welche kleiner sind. Die Einschnitte selbst sind rundlich, und

ferius autem definit in femina quator f, quae iuxta se posita in calycis fundo constituuntur *fig. 19.* et tenuia fereque ova-ta sunt *fig. 20.*

daß zwey derselben kürzer, als die andern beiden sind *fig. 14. d.* dünne, und mit einer stumpfen Spitze versehen ist, unten aber auf vier Saamen aufsetzt f, welche neben einander unten in dem Kelche stehen *fig. 19.* übrige dünne und oval sind *fig. 20.*

und von einerley Größe. Bisweilen ist auch, besonders durch ein geiles Wachsäum, die obere Lefze der Blumendecke in drey Theile geschnitten *fig. 7. g.* Vier kurze Staubfäden liegen nebst ihren Staubspitzen in der Blumendecke verborgen, doch also, Zwischen diesen steht der einzige Griffel *fig. 15. 16. e.* welcher